

Report verifica coerenza

Diagnosi ICD 10 vs Dipendenza Patologica

Gruppo RER ICD 10 - 30 maggio 2011



Obiettivi della ricerca

- Verificare il grado di applicazione delle Linee guida regionali per l'utilizzo dell'ICD 10 nei Servizi per le Dipendenze Patologiche.
- Focus sulla Scheda "Progettazione diagnosi e testistica" (S10) e sulla Scheda "Dipendenza patologica" (S12).
- Secondo le Linee guida regionali, la codifica della diagnosi prevalente deve essere coerente con la sostanza primaria d'abuso.

Metodologia

- L'indagine ha previsto la partecipazione di tutte le AUSL della Regione Emilia Romagna.
- Il periodo di riferimento è il secondo semestre del 2010 (dal 30/06/2010 al 31/12/2010).
- I dati sono stati raccolti da tutti i Ser.T. con la stessa interrogazione. Questo ha consentito di ottenere una banca dati omogenea per tutto il territorio regionale.

Codifica di Diagnosi prevalente

- Le “Linee guida regionali per l’utilizzo dell’ICD-10 nei Servizi per le Dipendenze” evidenziano come le diagnosi dei disturbi psichici e comportamentali dovuti all’abuso di sostanze psicoattive sono definite in modo completo nel settore V e prioritariamente dal Blocco F10-F19.
- Tra le diagnosi prevalenti rispetto ai Servizi per le Dipendenze che non rientrano nel Blocco F10-F19, presenti nell’archivio in esame, sono da ricomprendere F63.0, Z02, Z02.9, Z63.1, Z71, Z71.4, Z71.5, Z72, Z72.1 e Z72.2.
- Nell’archivio in esame sono inoltre presenti diagnosi che risultano incoerenti con le “Linee guida regionali per l’utilizzo dell’ICD-10 nei Servizi per le Dipendenze” .

Tab. 1A -Codifiche di diagnosi prevalente ICD-10
coerenti con le linee guida RER presenti nell'archivio

<i>Codifica</i>	<i>Diagnosi</i>
F10	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol
F11	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi
F12	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi
F13	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici
F14	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina
F15	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina
F16	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni
F17	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco
F19	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive
F63.0	Gioco d'azzardo patologico
Z02	Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi
Z02.9	Visita medica, non specificata, per scopi amministrativi
Z63.1	Problemi nei rapporti con i genitori o i parenti
Z71	Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri consigli o avvisi medici non classificati
Z71.4	Persone che ricorrono ai servizi sanitari per consulenza e monitoraggi per abuso di alcol
Z71.5	Persone che ricorrono ai servizi sanitari per consulenza e monitoraggi per abuso di droghe
Z72	Problemi connessi allo stile di vita
Z72.1	Problemi connessi all'uso di alcol
Z72.2	Problemi connessi all'uso di droga

Tab. 1B-Codifiche di diagnosi prevalente ICD-10
incoerenti con le linee guida RER presenti nell'archivio


<i>Codifica</i>	<i>Diagnosi</i>
B23	Malattia da virus HIV che dà luogo ad altre condizioni morbose
F31	Disturbo affettivo bipolare
F31.4	Attuale episodio depressivo grave senza sintomi psicotici
F32	Episodio depressivo
F33	Disturbo depressivo ricorrente
F39	Disturbo dell'umore (affettivo) non specificato
F40	Disturbi ansioso-fobici
F41	Altri disturbi d'ansia
F41.2	Sindrome mista ansioso-depressiva
F50	Disturbi dell'alimentazione
F60.0	Disturbo di personalità paranoie
F60.3	Disturbo di personalità emotivamente instabile
F60.7	Disturbo di personalità dipendente
F60.9	Disturbi di personalità non specificati
F63.9	Disturbi delle abitudini e degli impulsi non specificati
F88	Disturbo dello sviluppo psicologico di altro tipo
F89	Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato
O36	Assistenza prestata alla madre per altri problemi fetali accertati o presunti
Z00	Visita medica generale ed analisi di persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi
Z04	Esame ed osservazione per altre ragioni
Z64	Problemi correlati a talune circostanze psicosociali
Z73	Problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio modo di vita
Z76	Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze
Z86	Anamnesi personale positiva per talune altre malattie
Z87	Anamnesi personale positiva per altre malattie e condizioni morbose

Utenti per tipologia

- I soggetti nuovi o riammessi nei Ser.T. della Regione Emilia Romagna durante il secondo semestre 2010 sono risultati nel complesso 2807.


- Considerando la tipologia di appartenenza

- n 55% Droghe e/o farmaci
- n 37% Alcol
- n 6% Tabacco
- n 3% Gioco d'azzardo
- n 2% Altro



Sostanza primaria d'abuso


- n 33% Alcol
- n 31% Eroina
- n 11% Cannabinoidi
- n 10% Cocaina
- n 5% Tabacco
- n 2% Gioco d'azzardo



- n Nel 3% dei casi non è indicata la sostanza primaria d'abuso, si tratta in prevalenza di Giocatori d'azzardo 35%, Altro 26%, Tabagisti 21%.

Diagnosi prevalenti


n	34%	F10
n	31%	F11
n	9%	F14
n	7%	F12
n	6%	F17
n	5%	Z02
n	3%	F63



Confronto fra diagnosi e sostanza

- Il confronto fra Dipendenza primaria e Diagnosi prevalente consentito di distinguere i soggetti in 4 gruppi


- n 92% Coerenti
- n 3% Incoerenti
- n 2% No linee guida ICD10
- n 3% Manca sostanza



- n Vanno segnalati alcuni casi in cui sostanza e diagnosi sono coerenti ma il soggetto è classificato in una tipologia "incongrua" es. F10 – Alcol – Droghe e/o farmaci.

Diagnosi soggetti "Incoerenti" (n. 93)

n	45%	F10
n	23%	F11
n	14%	F12
n	7%	F14
n	5%	F63
n	3%	F13
n	2%	F16
n	1%	F17




Diagnosi soggetti "No linee guida ICD 10" (n. 61)

n 51% Z73 – 87 (prevalenza Z76)

n 31% F31-60 (escluso F55)

n 5% Z04

n 3% Z64




Diagnosi soggetti "Manca sostanza" (n. 79)

n 33% F63

n 23% F17

n 18% Z63

n 9% Z02





?????



ICD-10 has
140,000
Codes?

What's
ICD-10?

