

Tumori maligni della cervice uterina


ICD-10 C53

Casistica


incidenza	maschi	femmine
casi totali		169
tassi grezzi*		7,8
tassi st. ER '98*		7,6
tassi st. Europa*		5,6
rischio cum 0-74 aa**		4,2
mortalità		
	maschi	femmine
casi osservati		30
tassi grezzi*		1,4
tassi st. ER '98*		1,3
tassi st. Europa*		0,7
rischio cum 0-74 aa**		0,4
mortalità/incidenza***		17,8

* x 100.000 ** x 1.000 *** x 100

Confronti regionali - incidenza 2003-2007



Incidenza età-specifica




Sopravvivenza (%)

pool Registri

		età >14 anni			
		maschi			
		casi			
1 anno					
3 anni					
5 anni					
(IC 95%)					
10 anni					
		femmine			
		osservata	relativa	relativa	
		2001-2005		1996-2000	1991-1995
1 anno		88,8	89,9	90,9	90,8
3 anni		73,6	76,3	75,7	75,6
5 anni		67,8	72,3	70,7	71,7
(IC 95%)		(63,9-71,3)	(68,1-76,0)	(67,0-74,1)	(67,7-75,3)
10 anni		-	-	68,3	68,1

follow-up 31.12.2009

Andamenti temporali



anni	incidenza		mortalità	
	maschi	femmine	maschi	femmine
periodo		1991-2007		1995-2007
EAPC		-3,82		-4,40
IC 95%		-4,9; -2,8		-7,3; -1,4

Prevalenza (1.1.2006)

